

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十二

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱忻

謄錄監生臣趙廷麒

欽定四庫全書

普濟方卷三百七十二 明周王朱橚 撰

嬰孩驚風門

慢脾風

附論

小兒生下中慢脾風候時吐嘔頻咬牙手足掣癡舌捲
頭低兩眼上視先頭低而次視高此候久瀉痢而下冷
藥只止瀉痢不治得脾是以脾胃虛臟腑乘虛故此所
致先用均氣散調一日後便下一醉膏下後用治脾散

夾真心丸健脾散常服之即愈若使喘吐咽哽角弓反
風死候不治○小兒慢脾風候是傷寒疹子庸醫未明
表裏便即宣利臟腑更使冷熱藥相通故小兒眼不開
脾困極不省手足不收此病但回陽醒脾調治方愈若
更吐瀉必定損命也○曾經吐痢不止損傷肝胃或
慢驚之後病已傳極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若
逐風則無風可逐若治驚則無驚可治但脾間痰涎虛
熱往來爾其眼合者脾困氣乏神志昏迷痰涎凝滯然

爾所謂慢驚難治者慢脾風是也一名虛風凡小兒或吐痢之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱即傳慢脾矣纔見搖頭斜視以手摸人昏迷喜睡額上汗多身亦粘汗其聲沉小而焦即是脾風證未必皆由急慢驚風傳次而得醫者詳之○三關紋紫絲或青絲或黑絲隱隱相雜似出不出其證面青額汗舌短頭低眼合不開搖頭困睡常常吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷身溫而四肢厥脾氣困乏神志昏迷虛

熱往來痰涎凝滯○治法大要醒脾回陽黑附湯川烏散生附四君子湯靈砂若眼半開半合手足不冷尚在慢驚不可回陽或已傳慢脾陽氣未脫先服薑附回陽之劑手足漸暖宜漸退回陽熱劑以醒脾等藥調理○慢驚慢脾危惡之證可畏而大衝有脉眼中睛光瞳人動活顙門未陷面色不至黧黑襯脚知痒猶可用力即灸百會次服附子理中湯研回陽丹同服之○百會穴取前後髮際至頂門拆中又取兩耳尖至頂門拆中是

穴用線量之艾炷麥子大或五壯七壯。慢脾風候兒病至此所以難醫蓋由其證為驚與風傳經已極總歸虛處惟脾所受故不曰胃風胃屬陽其病既傳陰臟故無胃候兒既尚有胃氣可以一向生胃兼與回陽即漸甦省若更加攻擊驚風脾亦不受而又傳散諸經不可得而加藥若見眼合即是脾風宜服下項藥。治慢脾風乃是不得已而設其疾危如燈無油漸見昏滅錢氏所用金液丹又青州白丸子各半細研和勻飯飲薄荷

湯下一錢半錢許此乃截風回陽一方四君子湯加黑附末四分之二脚手冰冷者可和對半生薑棗子煎服之此方古人用之豈不周當所錄下項良方亦盡世之

善也

治慢驚慢脾須禁腦麝粉水銀粉霜之類及寒涼動臟等或以燥熱俱不可用只宜回陽醒脾湯

與服○慢脾風候十箇孩兒有九箇以艾灸之須當斟酌病候已未脉絕之理若一臟絕即不可用藥謂如眼無光指甲青四肢垂解五體俱冷不可勉強用藥○慢驚慢脾欲絕之時虛痰上

攻咽喉引氣粗大脉來浮數是謂陰盛強陽或誤認為陽氣已復又有喉中痰壅不識覆燈將絕之證又強用

藥痰隨氣下氣隨痰絕人以醫殺咎之○茅先生小兒

受慢脾風歌

四肢逆冷候吐瀉補還遲脾胃伏除涎擁肺心生毒熱面青時如此呼為慢脾候更加喘嗽不能醫○小兒形

證論四十八候慢驚傳慢脾歌慢脾只是傷寒轉吐瀉虛涎脾胃存四肢逆冷頻頻嘔沉困難醒豈易明唇

紅目閉手微搐病行心藏及脾神醫者鎮心為上法更開闕竅細詳論莫令加喘頭先軟眼白矇矇命不存○

四十八胃蕪有虛涎下大青丹一二服更將搐鼻散開闕次用醒脾散○四十八候慢脾將死候歌驚入風

痢傳在脾直眼不動卧如尸搐搦已休牽掣定為他安好不生疑便通大小難收斂偏體如冰汗若泥眼目不

開常似睡睡中不覺赴幽期○又四十八候慢脾侵肺歌慢脾多睡證何如吐瀉相傳脾胃虛逆冷四肢多重

困虛涎脾伏盛難除生風肺臟添邪熱任喚千聲氣不舒更使目瞪蕪項軟十中難保一人甦

大醒脾散 治脾風內虛昏迷不醒亦可釀乳

全蝎

焙

白附子

炮

天麻

炮

甘草

炙

人參

去蘆

白茯苓

去皮

木香

炮

石菖蒲

白朮

陳

皮

去白

南星

炮

石蓮肉

肉豆蔻

山藥

各二分

縮砂仁

一分

丁香

一分

右為呔咀薑棗煎服回陽加附子白薑

烏蛇丸

出傳信
適用方

治小兒慢脾風及慢驚風

烏蛇

一兩酒
浸一宿

天漿子

二十箇
去殼

天麻

半兩

乾蝎

分一 天南星

半兩炮

白附子

半兩

川附子

一兩炮

防風

半兩

半夏

半兩洗七次方用

已上並酒浸用火焙

乾為細末入後藥 牛黃 硃砂 麝香 雄黃

已上各一錢

右並研以糯米粥和丸如黃米大每十九一計時候煎荊芥湯下以風搐止為度

鈎藤煎 治小兒虛風

鈎藤

防風

去皮

芎藭

天麻

酒浸切焙

麻黃

去根節各

分一 荊芥穗

蟬殼

去土

蝎梢

炒各半兩

白僵蠶

十四

粒炒

薄荷心

二十六枚
酒浸焙

龍腦

麝香

各一
字研

右搗研為細末鍊蜜和成煎每服皂子大荊芥紫參湯下

羗活膏

山
新書
幼幼

治小兒急慢驚風或因吐瀉後脾胃

虛傳作慢脾之疾

羗活 獨活 人參 白茯苓 肉桂 木香

防風

已上各
三錢

水銀

硫黃

全蝎

各三
錢

金銀

箔

各十
片

真麝香

一
錢

右為細末蜜和為膏每服一黃豆大薄荷湯化下

醒脾散

四君子湯加 全蝎 陳皮 木香 白附子

炮

南星 炮 陳米 川烏 剉 半夏麴

右為末薑棗煎逐旋服急服則吐

醒脾丸

出十便良方

治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡

欲生風癇

厚朴 白朮 舶上硫黃 天麻

各半兩

全蝎

防風 人參

官桂

各一分

右為末酒浸蒸餅和丸如雞頭大每服一九搥研溫

米飲下

沉附湯

出直指方

治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子

炮

白附子

焙

全蝎

藿香

天麻

各等分

右為末每半錢灸甘草生薑煎湯調下身溫則去附

子

硃砂散

出幼幼新書

治慢脾風

硃砂

天麻

各一錢

殭蠶

七箇

天南星

一箇

白花

蛇

項下肉一塊肥皂子大

麝香

少許

蜈蚣

右為末每服一匙薄荷湯下

沒石散

出幼幼新書

治慢脾候此藥醒脾

沒石子

二箇

硃砂

三錢

滑石

研

白礬

丁香

各三

錢

半夏

一兩

生薑

三兩

捶爛

同浸水一宿

後將

半夏

劈碎

又以水同煮

乾取

出以麪一錢乳鉢搥爛
捏作餅子炙熟為末

右為末每服半錢以冬瓜子煎湯調下不拘時候

一醉膏 治小兒慢脾風候

花蛇鼻 蝎尾 天南星心 川烏臍 大附子

側 白附子耳 蜈蚣蟲肚

右各半錢生用以棗肉五十箇和前藥研成一塊以
腦麝滴水和丸如梧桐子大每服一丸用薄荷自然
汁磨化下

銀白散

出幼幼
新書

治小兒胃虛吐瀉煩渴成慢脾者

乾葛

人參

去蘆

白茯苓

山藥

白扁豆

各半兩

半夏

一分湯洗去滑姜製成餅炒黃

糯米

一合淘漲姜汁浸一宿炒黃

右為細末每服二錢水八分生薑二片同煎溫服

丁沉散 治小兒慢脾驚風似搐此名瘈瘲常似睡而

四肢與口中氣溫合眼露睛或啼泣如鴉聲

丁香

沉香

人參

白茯苓

白朮

炒

白扁

豆

右各等分為末每服半錢飯飲調下看大小加減

白殭蠶丸

出活幼口議

治嬰孩小兒慢風候痰涎盛不化

牛膽製

南星

錢一

白殭蠶

去熱炒

錢子地龍

五靈脂

川者

全蝎

炒黃以上四味各一錢

半夏末

一錢用生薑汁

浸

右為末水煮半夏末糊丸麻子大每服三十九煎金銀薄荷湯下一方薑湯下○脾家有風乃虛所致驚搐所由生也痰涎是故作也陰癇不暴其實駭醫若以衝烈之味投之愈見害重誠為不可所以禁却腦

麝通利關竅之藥悉無利益治法所宜者即今選用
妙方賴以活人白殭蠶一味去痰尤能截風既已傳
入慢脾則風痰混致驚熱交臨醫工看候用藥當權
緩急決其可否候未脫去陽者直宜與服之若陽虧
陰盛至危至急候變非常精神色脉俱足駭人者當
服下項良方一方無南星

鈎藤飲子

出幼幼
新書

治嬰孩小兒因吐瀉體虛發搐作

慢脾魚口眼直視睡不醒目不開

鈎藤 防風 麝香 麻黃 各一分
去節用 蝎稍 蟬

殼 各半
分

右為末每服半錢或一錢量大小加減薄荷湯調入
醋一滴調勻服如四肢厥逆入附子三兩片同水五
分薄荷一葉煎二分熱服連進三二服或吐瀉體冷
多睡用附子半錢炮去皮臍為末或作剉散白朮一
錢白豆蔻一箇甘草炙一寸棗一箇水八分慢火煎
至三分溫服作兩服體便暖只煎四君子湯加入沉

香橘皮喫五六分更喫暖驚藥三兩服乳母忌口不
再驚

黑附湯

出活幼口議

治慢脾痰盛四肢逆冷

黑附子

炮取末重二錢

白朮

錢一

南星

炮錢一

甘草

炙一

錢

半夏

湯洗七次一錢

右吹咀每服二錢水一小盞生薑三小片棗一箇煎
至半盞去渣通口以時時與服所覺手足暖其候漸
省藥即止之

木附湯

出醫方集成

治慢脾風身弓髮直吐乳貪睡汗流

不已

大附子

一箇炮

白朮

一兩煨

木香

半兩

肉豆蔻

一枚

麩

甘草

半兩

右咬咀每服二錢水半盞姜三片棗一枚煎服

辰砂膏 治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子

一枚八錢重去皮臍頂上刻一孔入辰砂丸一錢重用附子末塞之以炭火三七燒

存性

南星

炮半兩

白附子

炮

川五靈脂

蝎梢

各一分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一九生薑汁泡

調下

白殭蠶丸

治慢脾陽未甚脫者可用能截風

方見本門慢脾

風類

厚朴

去麤皮以水一小盞煮盡後細切焙乾用

白朮

湯浸半日切片子用蜜炙香黃

色

硃砂

各一分研

麻黃

半分長直者以熱湯浸軟用姜汁浸半日

乾

蝎

七個尾梢全者每箇用大葉薄荷裹上用浸軟麻黃纏了微以姜汁再浸以竹筋上灸令表裏

焦黃
色

右並擣羅極細再入乳鉢內與硃砂研千百遍每服
半錢或一錢煎金銀薄荷湯調下但小兒服藥
後微汗出是効凡小兒欲作慢驚必先壯熱多睡
頻吐若吐止即驚止不止定作慢驚為難治吐證以
金液丹研令細滴水為丸黃米大用硃砂青黛為衣
每服五十丸以上以下不濟事用米飲下定吐救生
丹亦甚佳然十有三四不能止者此方百無一失者

但費心力耳不然十有八九不救二方功效不可具述
千萬秘之非至誠好事者不可妄傳

丁香餅子丸

出幼幼新書

治小兒吐瀉後生風慢脾者及

久瀉亦治胃虛

丁香

五十粒

藿香葉

一分

木香

韶粉

大附子

炮各一棊子大一云各二錢

右為末攪勻生姜自然汁作餅子用粗燈盞內水煮
軟化開服或要急用作餅子入棗子一枚煎

大白再生丸 治小兒慢脾驚風似搐此名瘈瘲常似

睡而四肢與口中氣溫合眼露睛或啼泣如鴉聲

陽起石

酒煨浸

生硫黃

南星

炮

大附子

炮去皮臍

右等分為末用蒸餅為丸如菉豆大陳米飲下五丸至七丸更量兒大小加減服之

治小兒慢驚風吐奶霍亂吐瀉

出幼幼新書

丁香

錢一

霍香

三分

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服三丸或大段吐

瀉水飲下半錢

治脾風

出楊氏寶書

附子

炮二錢

蝎

七枚

白附子

三個炮

南星

炮二錢

右為末每服半錢水三分盞生姜一片冬瓜仁子五粒劈破同煎至二分量兒大小減加

黑附湯

出危氏方

治慢脾風面青額汗舌短頭低眼合不

開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃

氣極虛十救一二蓋慢驚之後吐瀉損脾病傳已極
總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐
若療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合
者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而然爾世所謂慢
風難治者慢脾風是也

附子

炮去皮
三錢

木香

一錢
半

白附子

一錢

甘草

炙
半

錢

右判散每服三錢水一盞生薑五片煎取一半以匙

送下若手足暖而蘇即止

醒脾散 治小兒吐瀉脾虛生風

天南星

一箇重七錢者去心入縮砂一錢丁香一錢南星內上面却用南星心末封口慢火

煨熟切碎

藿香葉 人參 白茯苓

各一錢

右為細末每服半錢入冬瓜子仁少許同煎至三五

沸溫服

治小兒慢脾風衆醫不效用此藥瘥

附子

炮製去皮臍

木香

不見火懷乾

肉豆蔻

生硫黃

去漿水煮黃耆赤者不用其間夾石者須去

右等分為細末每用冬瓜子四十九粒水六合煎至三合入藥一錢再煎至一合為一服治身冷汗出至虛緩搖者

醒脾虛風

出幼幼新書

大附子

一錢去皮臍炮去

大全蝎

七箇

大白附子

三箇炮

天麻

二錢

右為細末每服半錢濃煎冷冬瓜仁湯調下

治小兒慢脾初生者皆可服其狀困睡不醒或啼不已

出切切
新書

全蝎

兩箇以竹針穿微火炙令熟末之

麝香

少許

硃砂

西壁

土

半錢
細研

右和勻乳汁調下一字二三歲已上量添至半錢或三字亦得又濃煎金銀湯調下又蜜湯亦得

白附子散 治小兒及大人虛風呵欠止吐化痰

白附子

半兩
炮

天南星

半兩
炮

黑附子

炮去皮臍
取一錢

右為末每服二錢水一盞薑五片慢火煎至六分不計時候小兒一錢水一盞薑三片慢火煎不住手攪

勻煎至小半盞分三服

昔宣和間真州李博士景開以治吳內翰女孫甚效紹興

辛亥年吳內翰在康州陳傳即病風虛極昏吳教之服三四服而愈

人參散 治慢脾風多困神昏痰盛及治潮熱并傷寒

咳嗽或傷物吐逆驚風魯吐痢再發者一名惺惺散

人參 冬瓜仁

各半兩

天南星

一兩切片用漿水薑汁煮存性

右為末每服一錢水半盞煎至二三分溫服

治小兒慢脾風因吐痢後虛困昏睡欲生風癇

全蝎

二箇青薄荷
葉包裏煨

白朮

指面大
二塊

麻黃

長五寸
十箇去

節

右為末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下量
大小加減服

川烏散 驅風回陽

生川烏

一分

全蝎

去毒

木香

各半
分

右為末每服三字薑三片煎取其半旋滴入口中嘔

吐加丁香

活脾散 治小兒脾困成慢脾風

天南星

去皮

半夏

白附子

各等分

右為末每服半錢一錢小者一字用冬瓜子七粒薄
荷二片酒少許或入水少許同煎

小續命丸 治慢脾風四肢厥冷

一名附
疏丸

附子尖

一枚

硫黃

棗許
大

蝎梢

七枚

右為末生薑麩糊丸黃米大量兒加減十九至百丸

亦治小兒久瀉疳羸一方用生薑自然汁和丸米飲
下凡前方用附烏者不可執謂性熱其兒患脾風脚
手冷者有微有暴輕者即用湯盛即以丸重即以膏
服之皆效須候手足暖陽氣回即為佳更以醒脾正
胃藥溫暖腑臟補益腸胃奪命回陽必愈

醒脾散 治小兒慢脾風

馬芹子 白 丁香

右各等分為末每服一錢用炙橘皮湯調下

醒脾散 治四十八候

天南星

一箇去皮臍用硃砂入在南星臍肉令滿以麴畏慢火炮黃作散

白朮

一分 麝香少許

右為末每服半錢煎冬瓜子湯調下如為丸以生葱涎丸如粟米大每服十九丸研砂湯下後即與調胃散活脾散 治小兒慢脾驚風

羊糞

二十一箇炮

丁香

一百粒

胡椒

五十粒

右為末每服半錢用六年東日照處壁土煎湯調下

玉筋散 治小兒馬脾風

甘草

一寸煎水

甘遂末

一字

右同油蜜生薑銀釵兒攪調下後用冷水半盞調奪

命散

奪命散 治小兒馬脾風

川大黃 白牽牛 黑牽牛

各一兩並半生半熟

檳榔

一箇

涎多加膩粉少許

右為細末三歲每服二錢蜜漿調下

蝎梢膏 治小兒久病後或吐瀉生驚轉成慢脾候

蝎梢

不拘多少研為末簡新好者

石榴

一箇

右用石榴開作瓮子去子以無灰酒半盞調蝎末入石榴以葢子葢定坐文武火上時時攪動熬膏取出放冷每服一錢用金銀薄荷湯調下急驚勿服

黑子散 治小兒慢脾風

乾薑

半兩

甘草

一分

右同於一磁瓦合子內用火煨存性為末

煨須恰好過則力太

慢不及則性太烈

每服一錢或半錢濃煎烏梅湯調下臨時

更看兒女大小加減須是目垂而面青慢脾形候即

與服

搐鼻散 治四十八候

瓜蒂

一錢

細辛

半錢

右為末用半字吹入鼻中打噴嚏候眼開便將大青

丹取下積熱并下驚涎後調氣

大青丹方見急慢驚風類

加味四君子湯

助胃回陽

一名生附四君子湯

用四君子湯加生附子末四分之一厥者對加每服
半錢薑五片慢火煎以匙送下一方用棗煎一方加
川烏全蝎為末薑棗煎名烏蝎四君子湯如再服即
去川烏

靈砂正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎

用靈砂少許為細末米飲調下或用麵糊丸如粟米
大每服三丸米飲灌下傷瀉者勿用

八仙丸散 治慢驚虛風

天麻 白附子 花蛇肉 防風去蘆 南星炮

半夏麴 冬瓜子 全蛇各等分

右咬咀每服一錢水半盞生薑二片煎至二分加棗子煎去渣有熱加薄荷或加殭蠶炒慢驚加川烏

又方

真川烏一枚生去皮臍 全蝎等分 人參二錢 甘草炙一錢

右細切分三服用水二盞生薑二片煎至一盞逐旋無時服

治小兒慢脾風

用代赭石不拘多少細研水飛過研冬瓜仁湯調下
量兒大小與半錢或一錢小兒因轉瀉後眼戴上三日
不亂目睛通黃如金色氣將消絕止服三服全愈

慢肝風

附論

幼幼新書云小兒慢肝風歌曰孩兒眼澀羞明日春不
宣兮夏不通秋被毒風傷肺得次傳肝腎別尋蹤先調
五臟患方退退得肝風便有功蓋謂小兒元氣此名喚

作慢肝風蓋此病肺與肝相克見日眼不開未出月有目腫者或出血者

甘膽湯 治慢肝風羞日目腫出血

用甘草一截以猪膽塗炙為末每服半錢米泔調下治欲出血目澀不開

用蒼朮不拘多少入猪膽中線縛定煮熟將藥氣衝眼後更嚼藥以汁咽吐渣尤妙

驚悸

附論

心藏神而惡熱小兒體性多熱若感風邪則風熱傳於
腑臟其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發為驚甚
不已則悸動不寧是為驚悸之病

天竹黃丸 治小兒驚悸壯熱黃瘦不思乳食

天竺黃

研細

黃連

去鬚

柴胡

去苗

羚羊角屑

蔓

荊子

犀角屑

防風

去蘆

子芩

川升麻

麥

門冬

去心焙

甘草

炙赤微剉

玄參

白茯苓

微炒去刺

硃砂

研細

木香

龍腦

研細

麝香

研細

牛黃

細研已上
各一分

右為末與研了藥都令勻煉蜜和丸如菉豆大每服
以溫水化下五丸量兒大小以意加減

鐵粉煎 治小兒心熱多驚悸晝瘥夜甚象鬼神所著

鐵粉一兩

牛黃

一錢
細研

菖蒲

三錢

酥

三兩

犀角屑

人參

去蘆

茯神

百合

防風

川大黃

剉碎

青黛

細研

細辛

遠志

去心

芍藥

麻黃

去節根

薯蕷

甘草

炙微赤剉已
上各半兩

蜜

半筋

右先擣諸藥用水三升入銀鍋中煎至半升以綿濾
渣入甕瓶中每服以溫水用二大豆許日三四服
量兒大小加減服之

金泥煎 治小兒心熱多驚悸

金箔

七十片

水銀

一兩半

遠志

一兩去心

菖蒲

三分

鈎藤

三分

龍腦

三分去蘆頭

龍齒

三分

人參

三分去蘆頭

赤茯苓

三分

青黛

一分

蚱蟬

三枚去翅足

麝香

一分

虎睛

一對微炙

牛黃

一分

甘草

三分微炙赤剉

酥

四兩

蜜

半
筋

右水銀金箔同研如泥又別研麝香虎睛牛黃青黛
四味如粉其餘藥搗篩為散入銀鍋中先以水二升
文火煎取半升以新綿濾去渣再入鍋內酥蜜及金
泥并研了藥等慢火煎不住手以柳篋攪如稠餚入
瓷合內盛每服取二大豆許以溫水調服日三四服
量兒大小加減服之

遠志煎 治小兒身體熱壯驚悸心神不寧安心神

遠志

去心

羚羊角

剉屑

杏仁

湯洗去皮尖雙人麵炒微黃

茯神

紫苑

洗去苗土

龍骨

防風

去蘆頭各半兩

龍膽

一分去蘆

蚱蟬

一分去翅足

百合

一分

牛黃

一分細研

麝

香

一分細研

川升麻

三分

川大黃

一兩剉微炙

酥

三分

蜜

半筋

右先研牛黃麝香二味為粉除酥蜜等二味外粗擣用水三升入銀鍋內煎至半升以新綿濾去渣却入鍋內下牛黃麝香酥蜜等以柳篦攪如稠飴入甕合

內每服二大豆許溫水調日三四服量兒大小加減

牛黃丸 治小兒驚悸壯熱黃瘦髮堅

牛黃

一錢
細研

犀角屑

天竺黃

細研

硃砂

半兩
細研飛過

白附子

炮製

茯神

黃連

去鬚

羚羊角屑

防風

去蘆頭

玄參

枳殼

麩炒微黃去瓢

甘菊花

人參

去蘆

頭

黃耆

剉

甘草

炙微赤剉

麥門冬

去心焙一兩

黃

芩

已上各一分

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每

服以淡竹葉湯調下五丸日三四丸量兒大小加減服之

天鎮丸 治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸四肢

戰掉舉動欬倒狀類暗風或煩躁多啼退驚風化痰

壅壯心氣益精神

方見本門一切驚風類

金箔丸 治小兒驚悸眠睡不穩

方見本門一切驚風類

真珠丸 治小兒風熱心神驚悸睡卧不安

真珠末 羌活

去蘆頭

防風

研各一分

鈎藤

龍膽

天竺黃

研

升麻

牛黃

研各一分

茯神

去木

人參

羚羊角屑

犀角屑

各一兩

鉛霜

龍腦

麝香

各一分研

右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大每服用荊芥薄荷湯調下五丸日三四服化一切驚涎

大丹砂丸 治鎮心神涼咽膈壓驚悸退壯熱化風涎

丹砂

研水飛過

甘草

炙

白茯苓

去黑皮各二兩

馬牙硝

研一分

人參

一兩

礪砂

研三錢

牛黃

研半錢

龍腦

研

麝香

研各一錢

右擣研為末煉蜜和丸如雞頭大每服一九用竹葉湯化下食後臨睡服大小以意加減服之

丹砂丸 治驚悸退壯熱止涎嗽利咽膈除眠睡不穩

丹砂

二兩細研水飛過

半夏

二兩湯洗七遍

乳香

研半錢

人

參

白茯苓

去黑皮各半兩

天南星

炮裂一兩

牛黃

研二錢

龍腦

研一錢

右為末用白麪糊和丸如麻子大三歲兒服十九至

十五丸不拘時用竹葉乳香湯下量大小加減

鈎藤湯 治小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出

鈎藤

兩一

人參

兩一

蚱蟬

微炙去翅
足一兩

黃芩

去黑
心一

兩

澤瀉

兩半

龍齒

研如粉
兩半

防風

去蘆
兩半

蛇蛻

皮

微炙令黃
色三寸

右粗搗篩一二歲小兒每服一錢水半盞入竹瀝半
合石蜜少許同煎至四分去渣分溫二服空心午後
各一更量兒大小加減服之

人參湯 治小兒壯熱驚悸并熱瘡出

人參

三分

茯神

去木半兩

龍齒

研如粉一兩

蚱蟬

去足翅頭

微炙二枚

鈎藤

一分

麥門冬

去心焙一兩

杏仁

去皮尖雙仁麴

炒令熟一兩半

蛇蛻皮

微炙令黃二寸

右搗篩一二歲兒每服一錢水半盞煎至三分去渣入牛黃一大豆許分溫二服空心午後各量兒大小以意加減服之

定心丸 治驚悸煩躁

北參

遠志

薑製
焙

茯神

天麻

犀角

各一分

硃砂

錢一

麝

字一

右為末煉蜜和丸如皂子大金箔衣丸薄荷湯調下

天竺黃丸

治小兒壯熱驚悸不得眠睡

天竺黃

細研

黃連

去鬚

川大黃

剉碎
微炒

牡蠣粉

黃芩

梔子人

遠志

去心已上
各半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以新汲水下五丸

量兒大小加減服之

茯神湯 治小兒風熱驚悸心忪恐悸

一名茯神散

茯神

去木一分

龍齒

兩半

寒水石

研一分

升麻

二分

石膏

研細一兩

麥門冬

去心焙三分

右粗搗篩三歲兒每服一錢水七分入竹瀝少許煎至四分去渣溫服日三夜一量大小以意加減服之

一方用甘草

麥門冬 治小兒虛熱驚悸睡中時叫

一方人參散

麥門冬

去心焙一兩半

人參

兩半

龍骨

一兩

茯神

去木三分

甘草

炙一分

犀角屑

半兩

右粗搗篩一二歲兒每服一錢水七分入生地黃汁少許同煎至四分去渣日三四服量兒大小以意加減

牛黃散 治小兒心熱驚悸

牛黃

研一分

天竺黃

研半兩

鉛白霜

研半兩

玄明

粉

研一兩

人參

半兩

白茯苓

去黑皮半兩

右搗羅人參茯苓為末同牛黃等研為散一二歲兒

每服半錢用薄荷湯調服三四歲兒每服一錢日三服早辰午間晚各一量兒大小加減

溫膽湯 治驚悸煩躁驚風已退神志未定須先化痰以利驚或下定志丸或蝎餅

半夏 製

枳實

各二錢半

橘紅

一方作陳皮

甘草

各一錢半

酸棗仁

溫湯浸去殼各二錢半

右劉散每服一錢入竹茹少許用薑棗煎服

天竺黃散 治小兒驚熱筋脉抽掣夜臥驚悸四肢煩熱

天竺黃

研半兩

麝香

鹽水煮一分

粉霜

研一分

鉛白

霜

研一分

山梔子

兩半

右搗研為散一二歲兒每服半錢用新汲水調服三四歲兒每服一錢日二早晨日晚各一更量兒大小加減服之

紫金散 治小兒驚不安

鐵粉

龍齒

石膏

牛黃

並研如粉

甘草

生末各一分

右先搗龍齒石膏為末與諸藥同研如粉每服半錢

用淡竹瀝調服三四歲兒每服一錢一日三服早辰
午間日晚各一量兒大小以意加減

犀角飲子 治小兒心熱驚悸竹瀝磨

竹瀝

三合

犀角 半夏

末

南星

末二味姜汁
搜餅子晒乾

苦桔梗

去蘆各
五錢

甘草

二錢

右同研為末薑汁同桑白皮汁煮麪糊為餅子研煨
白礬為衣生薑湯送下

龍齒散 治小兒驚悸夜啼

龍齒 茯苓 白附子 炮 蟬退 甘草

右等分為細末每服半錢薄荷湯下卧時服尤佳

天癰驚風

天癰之候心神不安手足抽掣驚悸壯熱眼目翻騰或啼或笑喜怒不常甚者指甲皆青此因乳母飲食不常酒肉過度或憂驚之氣入乳宿滯不消胃膈壅滯邪熱蘊積漸生痰涎腑臟之氣不能宣通瘕癥不定發作無時翻眼擡睛壯熱神祟頭目仰視名為天癰又有二十

四癰各有種類灸法凡有此候宜服蘇合香丸灸兩手
大拇指面甲肉相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指
節中間各三五壯又手心五壯又後心七壯此皆得效
○驚風內癰腹痛多啼唇黑囊腫偃僂反張眼內有紅
筋班血者是蓋寒氣壅結兼驚風而得之又盤腸氣與
虫證亦令腹痛多啼偃僂時若盤腸氣痛則腰曲乾啼
額上有汗是小腸為冷氣所搏然爾內癰虫痛則嘔吐青
沫痛有去來唇口紫色是疳化為蛔虫臟腑留滯然爾

內癰用調氣止嗽疎風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之

劑虫証用殺虫之劑○

漢東王先生云如驚風內癰即用桃符丸服後却復進乳食九

并大七寶散如得盤腸氣病即用癰瘻膏二三服又麝香散二三服亦須用大七寶散二三服如得或得虫痛

腹肚癰痛即用乾漆散二三服并化虫九三五九亦問與大七寶散服之○茅先生云天病之候急進奪命散

與吐下風涎然後用釣氣散醒脾與調勻氣候常服雄硃散夾鎮心丸健脾散與服之即愈如見眼直視魚口

鵝聲眼無光指甲黑者死候不治也○又云小兒生下五六箇月已上至七歲有結痞在腹成塊如梅核大來

去或似卵大常叫疼痛不住者亦分數類在臍下痛者為病氣下芸臺散夾茴香散與服即愈如見面黑眼視

瀉黑血鼻口手足冷不進食者不治活幼口議曰氣和乃升降安樂之由也氣逆則壅結病疾之致也幼兒有

患盤腸非暴所得由元氣鬱積久不散榮壅衛結五臟六腑不舒暢其氣乘虛而發周流上下築隘于腸胃又間有聲淚輒連而如猫吐惡視之不忍何以能堪嗟乎一身四大無主又有痢腸之証寒氣壅熱內不伸舒因而引氣鼓動臟腑胃堂無臍上下吊促曲躬偃僂就忍疼痛二候既作駭醫驚眾然俱氣所患受發不同盤腸宜以勻氣散加沉香煎服之無不愈痢腸當用真硃丸加以沉香煎鉤藤湯送下微通即瘥然後更與調氣順筋根本方佳勝也

胡黃連丸 治小兒一切疳瀉驚風天癇

胡黃連

兩半

木香

蛤蚧

酥炙各一分

蝸牛子

去殼七枚

人參

雄黃

研各半兩

牛黃

研

丹砂

研各一分

乾地

龍炒三分

青黛研

乾蟾燒灰

黃連去鬚

檳榔剉

當歸焙

天麻 犀角

乾蝎炒

蟬蛻炙

盧

薈研

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

蕪荑茶 麝香

驢胎耳炙各一分

蜣螂炙五枚

赤石脂研

代赭搗研

各半
兩

猪牙皂莢二挺炙去皮子別搗末

右為末猪膽汁和丸如黍米大每服三二丸空心用

溫米飲下量兒大小加減服之

天漿子散 治小兒天癰驚風

天漿子 天南星 白附子 犀角屑 丹砂

雄黃

研

附子

炮製去皮臍

乳香

研

白花蛇

酒浸炙用

肉

半夏

湯浸洗去滑與生薑汁同搗捏作餅子暴乾

白僵蠶

炒各一分

膩粉

牛黃

研各一分

麝香

一字

金箔

銀箔

右為末除別研外搗羅為散入研藥和令勻每服一字薄荷湯調下日三更量兒大小加減服之

青黛丸

治小兒天癰客忤五疳八痢十二驚癇

青黛

研

乾蝦蟆

一箇黃泥裹燒赤去泥研

黃連

去鬚

天竺

黃研

乾蝸牛殼

洗炒研

地龍炒

人參

鉤藤

炙

龍膽

各一分

蘆薈

研

熊膽

研各半兩

牛黃

研

麝香

研

雄黃

研

丹砂

研各一錢

夜明砂

胡黃連

右搗羅七味為末與十味研者勻和以燒飯丸如麻

子大一歲一九至二九粥飲下一歲已上以意加服

保命丹 治小兒天癆心胃痰壅攻咽喉作呀聲發歇

多驚不得眠卧

一名保命丸方見本門慢驚風類

牛黃

硃砂

整塊上茅者

羌活

木香

各一分

麝香

四銖

巴豆

和皮醋炙一十沸去皮不出油使三箇

附子

火炮去皮半箇

蝎梢

五十箇生薄荷四片碎切同炒令極乾去薄荷不用

右件藥先杵蝎梢附子羌活三件為末方將衆藥於

乳鉢內研如飛塵以蒸餅丸如菉豆大濃煎薄荷湯下一丸蓋衣被得些汗便效

保命丹 治天癘驚風

全蝎

焙

蟬蛻殼

直僵蠶

微炒

天麻

犀角

天漿子

有子者

白附子

南星

炮

青黛

硃砂

川薑黃

各等分

麝

少許

右為末雄猪膽汁為丸如菉豆大先將井水調開一
丸入鼻令嚏次以鈎藤湯調服一方無犀角

鈎藤散 治天癰驚

鈎藤

一方用鈎藤鈎子

白茯苓

各半雨

大黃

濕紙裹煨三錢半

防風 硃砂 蟬殼 羌活 獨活 青皮 甘

草

炙各二錢半

右為粗末每服一錢薑棗煎服

蟬殼丸 治小兒天癆身體發熱口內多涎筋脉拘急

時發驚掣

蟬殼 白僵蠶 白附子

蚬蛭

並炒

蜚蠊

三枚微炒

烏蛇

一兩酒浸去皮骨炙令黃

蟾酥

青黛

麝香

並細研各一分

獾猪膽

一枚

右為細末以軟飯入猪膽汁同和丸如黍米大先將一丸用乳汁研破滴在鼻中候嚏即以薄荷湯下三丸三歲已上加丸服之

鈎藤丸 治小兒天癇身體壯熱筋脉拘急時時抽掣

鈎藤

胡黃連

各半 兩

麝香

細研 半分

天竺黃

牛

黃

硃砂

各細 研

天麻

白附子

炮製

乾蝎

微炒

米粉

已上各 一分

右為末同研勻用槐膠和丸如菉豆大於顙門上津

調摩一丸荊芥湯下一丸立效二歲已上消詳加之

銀硃丸 治小兒天癇多驚搐搦眼忽戴上吐逆夜啼

遍身如火面色青黃乳哺不食並無情緒

一名白 銀丹

水銀

一兩 青州棗二十枚 同研 水銀星盡

硃砂

研作衣

乾蝎

生

牛黃

研入

麝香

研已上各一分

天南星

半炮半生

白僵蠶

白附子

各生用

鉛霜

研入已上各半兩

右除水銀膏牛黃麝香鉛霜三味研令如粉餘四味

搗羅為末都研令勻用水銀膏和丸如黍米大二歲

兒每服三丸用薄荷湯下至三四歲每服五丸不計

時候以意量兒大小加減服之一方不用硃砂作衣

名水銀丸一方有粉霜無鉛霜

再生散

治小兒天癰驚風潮搐項筋緊

烏蛇

酒浸去皮

天麻

天南星

炮

乾蝎

炒各一分

麝

香

研一錢

膩粉

研半錢

丹砂

研一錢

牛黃

研

白

附子

各半錢

右除別研搗羅為散入研藥令勻每服半錢煎金銀湯調下早晚各一服更量兒大小加減

龍齒散

治小兒天癰手脚掣動眼目不定有時啼哭

或怒嗔爪甲皆青狀似鬼祟

龍齒

細研

白茯苓

一方用赤茯苓

鈎藤

各半錢

蟬殼

七枚

微炒

甘草

炙

鐵粉

細研

硃砂

細研

川大黃

剉碎微炒

黃丹

各一分

右為末入研藥令勻每服一錢以水一小盞煎至六分不計時候量兒大小加減溫服之

九龍控心散

治天癰七竅壅聚痰塞經絡關膈不通

潮涎灌心眼目翻騰頭項仰強

赤蜈蚣

一條酒炙

滴乳香

一錢別研

天竺黃

二錢半

臘

茶

二錢

雄黃

二錢 別研

甘草

二錢 炙

荊芥穗

一錢 炒

白礬

一錢 假

萊豆

半生 半炒

右為末每服半錢每一歲一錢煎人參薄荷湯調下

天麻丸 治小兒天癇眼目翻上手足抽掣發歇不定

天麻

末

硃砂

龍齒

鉛霜

天竺黃

已上各一分

麝香

半分 五味 並細研

白芥子

微炒 一分

天漿子

七枚

右為末煉蜜和丸如黃米大不計時候以薄荷酒研下一丸稍急加至三丸或五丸立效

牛黃散 治小兒天癰眼目喎斜手足驚掣發歇不定

牛黃

研細

乾蝎

生用各半分

木香

一分

羌活

獨活

白僵蠶

生用

硃砂

細研水飛過各半兩

乳香

一顆如粟米大

右為末羅為散同研令勻不計時候以乾槐枝煎湯調下一字量兒大小加減服之

胡黃連丸 治小兒驚風天癰并一切疳痢

胡黃連

半兩

肉豆蔻

去殼一枚

檳榔

煨炒

訶梨勒

去

殼

紅雪

蜜陀僧

丁香

各半兩

右為末麪糊為丸如麻子大每服三九五九空心米飲
下心疳黃連湯肺疳米飲脾疳羸瘦紅棗湯食疳吐
血生薑湯驚疳瀉血鹽湯肝疳目皮中生瘡甘草湯
腎疳冷地卧食泥土紫笋茶湯氣疳腹脹橘皮湯一
方入麝香一分和勻

牛黃膏 治驚風天癇

白附子 全蝎 爵金 雄黃 各一分
蟬蛻 六十

膩粉 半錢
巴豆肉 一分水
浸一宿

右研細末蜜和丸入龍腦麝香各少許每服皂子大薄荷冷水下

硃砂丸 治小兒天癆心神煩亂搖擗不定

硃砂

細研

白殭蠶

微炙

胡黃連

熊膽

各一分

黃牛

黃麝香

並細研各半兩

乾蝎

七枚微炙

右為末同研令勻以粟米飯和丸如菉豆大不計時候以金銀薄荷湯下三丸量兒大小加減服之

定命丸 治小兒慢驚風天癆撮口搦乳癰壯熱困重

一名定命丹

方見本門急慢驚風類

蟬退散

治兒驚風天癆撮口搐搦乳癰心熱夜啼驚

癰

蟬退

六十箇去土足翅

荊芥穗

一兩

甘草

半兩蜜炙

大黃

半兩

紙裹煨

黃芩

半兩生用

蝎梢

五十箇去毒

右剉散每服二錢水一盞白茅根煎服夜啼蟬退疹

瘡紫草得利止

木香丸

治兒內癰肚痛驚啼

木香

沒藥

船上茴香

炒

鈎藤

等分

全蝎

乳香

各半兩

右以乳香沒藥別研次入諸藥末合畢大蒜少許研細和丸桐子大日乾每二丸鈎藤湯調下

芸臺散

治小兒疳氣治腹肚疳

芸臺子

炒

蓬莪茂

炮

茴香

炒

青橘皮

去白

甘草

炙已上各一兩

木香

炮一分

右為末每服半錢用鹽酒熱調下

抵聖丹 治天癰胃膈不利乳食不下急驚風

錫愰脂

一兩研極細水飛
淘去黑水令淨

牛黃

鉛霜

熊膽

各一分
並細研

麝香

蟾酥

一錢
研

右研勻粳米飯和丸如黍米大每服五粒至七粒新

汲水下

牛黃散

治天癰清心截風

一名清
心散

牛黃

半兩
細研

硃砂

細研
水飛

麝香

細研各
一錢

鈎藤

蝎梢

各為
末

天竺黃

研各
半兩

右研勻每服一字新汲水下

臍粉丸 治小兒天癆臍腑風熱壅滯四肢抽掣大小

便不利

臍粉 巴豆霜 麝香

細研各半兩

麝金 地龍

馬牙硝各一分

右研令細以糯米飯和丸如菉豆大一歲一丸以薄荷湯下三歲已上即服二丸

牛黃丸 治小兒天癆

牛黃 硃砂 鈎藤 各一分末 蟾酥 麝香 蝸牛

去殼
十枚

右研細令以糯米飯和丸如黍米大不計時候先以
水化破二九滴在鼻中相次即以溫水更下三九量
兒大小加減服之

保生定命丹 治小兒天癰四肢抽掣眼目戴上精神
恍惚皮膚乾燥身體似火夜卧不安心中煩躁熱渴
不止宜服此藥

光明砂

研水飛過

水銀

黃棗肉研令星盡各一兩

膩粉

牛黃

腦麝

金箔

四十片

右研如粉入水銀更都令研勻用粟米飯和丸如麻子大三歲兒每服用新汲水研破三丸服之三四歲兒每服五丸不計時候量兒大小以意加減服之

鈎藤飲 治天癩潮熱

鈎藤 人參

去蘆

犀角屑

各半兩

甘草

炙半兩

全蝎

天麻

各一分

右為末每服一錢水半盞煎至一半去渣服

赤靈丸 治小兒癰癤病急慢驚風

丹砂

研水飛過

人參

為末各一兩

酸棗

研二兩

白麴

錢二

乳香

研半兩

右和研令勻用生蜜和膏入新竹筒內以油紙封扎
定坐飯甑上炊候飯熟為度分作三十九每丸分
四服薄荷湯化下更量兒大小以意加減服之

麝香散

治小兒驚風天癇小兒卒然驚悸眼目翻騰

壯熱不已四肢抽掣上仰如釣縛之狀名曰天癰乍
作乍止此風熱痰涎之所發也良由乳母恣噉五辛
熱酒之類毒熱氣流入乳中因即乳兒兒飲乳臟腑
風熱脾胃生涎痰涎既生心肺壅滯不得宣通致令
心神不安為天癰之病

麝香

研

膩粉

研

牛黃

研

乾蝎

去土炒

白附

子

炮一分

右研極細每服一字薄荷湯調下早晚各一服

乳香丸 治驚風內癰腹痛驚啼

鷄心檳榔

半錢

乳香

半錢

沒藥

沉香

各一錢

蝎梢

十四箇

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二丸菖蒲鈎藤煎湯調下

靈花歸丹 治感厥急風心邪癰疾小兒天癰驚風及疳熱等病

蛇黃

四兩紫色者佳用火煨令通赤取出以紙襯地上出火毒一宿杵羅為末更入乳鉢研如

麩

獷猪糞

二兩野放小硬者用瓶子固濟燒纔烟盡為度勿令白過恐藥劣候冷研

令細

硃砂

兩半

鐵粉

一兩

麝香

一錢研

右乳鉢內同研極細以糯米粥為丸如鷄豆大一切風用薄荷湯酒磨下一丸小兒半丸疳熱用冷水磨下一丸分作四服修合時忌婦人雞犬見如是大人小兒中風口噤反張涎滿者灌下一服立醒小兒被驚及發熱並以薄荷煎湯磨下此藥又名神穴丹合子挑漆盤於日內曬之及乾翻看每丸下有一小穴通

丸內其藥中空也舊法須用端午及甲午日合急即
不須

靈砂丹 治衆疾及小兒癘風

硃砂

兩半

大附子

炮

青橘

去白

杏仁

去皮尖
各一兩

巴豆

春冬用一百箇秋夏用五十
枚以水五升慢火煮三十沸

右先將巴豆以水五升煮令油出水盡為度細研與
衆藥末和勻以粳米飯和丸如豌豆大小兒癘風桃
柳枝一握煎下小兒肚脹石榴湯下小兒及患人相

度虛實加減服一方用炮薑一兩

南星丸 治小兒天癰口噤戴目手足搐搦不定

天南星 天雄 白附子 水銀

於銚子內先鎔黑錫半分後下

水銀結為沙子細研

半夏

湯洗七遍去滑各一分

右為末用槐膠和丸如黃米大一歲一九三歲三丸
不計時候以溫薄荷湯化下

治小兒天癰多涎搐搦發歇不定

乾蝎

微炒

羌活

鉛霜

細研各半兩

麝香

細研一錢

蟾

酥

研入
半錢

右為末同研令勻煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷汁破兩丸服之量兒大小以意加減

茴香散 治四十八候

茴香

炒

芸薹子

各半
錢

田螺殼

二錢

甘草

三寸
炙

川楝子

一分
用肉

右為末每五分煎沉香湯調下木香湯亦可

治小兒天癰牙關急硬筋脉搐掣

乾蝎

七枚
生用

硃砂

一分
細研

麝香

牛黃

各
研細

糊

獼猴頭骨

塗酥炙黃
各半分

右細羅為散不計時候用新汲水調下五分極者不過三服瘥量兒大小以意加減服之

一字散 治小兒天癰四肢拘急時復搐搦喉內多涎夜即驚厥宜服

天南星

炮製

蕎麥

研入各
一分

壁魚兒

十枚

半夏

七枚

生用
醋石榴殼

右為末入在石榴殼內以鹽泥封裹于竈下慢火燒以泥乾燥為度取出去殼焙乾搗細羅為散如孩兒小弱只可用一字以乳汁調灌之一歲已上用酒調一字服汗出為效

殭蠶散 治天癩

白殭蠶

炒

馬牙硝

研

麝金

乾蝎

去土炒
各半兩

右搗研為末每服一字乳汁調服甚者五分不拘時候

治小兒天癩驚風搐搦牙關緊閉目吐涎

天竺黃

雄黃

燕脂

各一分

阿魏

半分

右同研為末以醋一茶碗煎成膏入蚘蛭天麻烏蛇末各半分和丸米粒大不計時候溫酒下三九乳汁下亦得量兒大小加減服之

治小兒天癩多涎搐搦發歇不定

天竺黃

硃砂

各細研

乾蝎

微炒

白附子

炮製各一分

右為末同研勻以煉蜜和丸如菉豆大不計時候以

淡竹瀝研一九量兒大小臨時加減

治小兒天癰臟腑風熱壅滯四肢抽掣大小便不利

巴豆霜

一分

乾蝎

微炒

藿香

白殭蠶

微炒各半兩

右為末以麪糊和丸如菉豆大三歲以金銀犀角煎湯下一丸如無動靜更服二丸下惡物煑煤及瓜汁相似便瘥量兒大小加減服之

一字散 治天癰醒風爽精神

天南星

半兩微炮製

蟬殼

一分微炒

白殭蠶

乾蝎

各一

分

右為細末次入蕎麴一分用醋石榴殼一枚將諸藥入在石榴殼內以鹽泥封裹于竈下慢火燒之泥乾為度取出再研勻每服一字溫酒調下

歸命丹 治小兒天癩多涎及搐搦不定

水銀

一分以少棗肉研細令星盡

牛黃 麝香

各半分

錫愰

脂

一兩細研水淘黑水令盡

右細研用軟粳米飯和丸如黍米大不計時候以新

汲水下二九量兒大小加減服之

治小兒天癰及驚風發歇不恒方

鸛鵒糞

微炒

牛黃

細研半分

乾蝎

五枚微炒

麝香

一分

右為末不計時候新汲水調下五分量兒大小加減服之

蚱蟬散 治小兒天癰眼目搐上筋脉急

蚱蟬

微炒

牛黃

雄黃

並細研各一分

乾蝎

七枚生用

右為散不計時候薄荷湯調下一字量兒大小加減

服之

治小兒天癰臟腑壅滯壯熱搐搦

五靈脂

一兩

白附子

生用

南星

生用

各一分

右為末以醋一升熬成膏後入蝸牛末二錢麝香一錢和丸如菉豆大每服一歲一丸以乳汁研破服之如無乳汁即以金銀湯下入口瘥

保生丸 治小兒天癰臟腑壅滯壯熱搐搦

巴豆

七粒生用
去皮心

天南星

一枚
炮製

蚘蚘

五枚
生用

右將前藥晴明時初夜于北極下露之一宿明旦搗羅
為末取豉四十九粒口內含不語脫脚皮爛研和丸
黍米大隨年丸數以溫水下

殭蠶散 治小兒天癩及急驚風搐搦

白殭蠶

二枚
微炒

蚬蛸

一枚
微炒

莨菪子

一枚
微炒
令黃

右細羅為散用溫酒調注入口中令睡汗出即瘥如
睡久不可驚起如一二歲患急即頓服之稍慢即分三服
玄參丸 治小兒天癩驚風搐搦牙關急閉目吐涎

元參 水銀

各半兩

乾蝎

一分微炒

右為末以棗瓤研水銀星盡內少煉蜜同藥末和丸如菴豆大三歲已下用薄荷湯研破三丸服之三歲已上即加丸數服

定命散 治小兒天癇驚風不能哭泣

藜蘆 欝金 川芎

各等分

右為細末鼻中滴嚙之如哭可醫

欝金散

治小兒天癇急驚風盛熱

方見本門急驚風類

治天癰翻眼向上

硃砂

通明者菜豆大三粒

乾蝎

一箇全者銚內炒過

右為細末以飯少許和丸如菜豆大患者用硃砂少許細研入酒內化下一丸頓愈

塗顛法 治小兒天癰驚風

草烏

一作川烏

芸薹子

等分

右為末用新汲井水塗顛頂上

雙金散 治天癰驚風日久不下眼見白睛兼角弓反

張聲不出者

蜈蚣

一箇去頭足尾真酥塗慢火炙黃置砵子上面南用竹刀子當脊縫中停剗作兩箇在邊

者入一左貼內寫左字右邊者亦入一貼子內寫右字不得交錯大悞矣

麝香

一錢細研

分二處先將左邊者同入乳鉢內研作細末却入在左字貼內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研極細却入右字貼內不得相犯收之

右以細葦筒子取左字貼內藥少許吹入左邊鼻右亦如之用藥不可多若眼全未下更添些小其眼便下即止

治小兒天癩眼目搐上并口手掣動宜服此方

用壁魚兒十五枚如已乾者以乳汁相和研爛更入乳汁用灌入口立效

南星散 治小兒天癩

用天南星大者一枚掘地作坑安瓦一片先用火燒赤後放天南星於瓦上用酒半升傾天南星上即以蓋子覆之候冷剉搗羅為散每服一字溫酒調下二歲已下以乳汁調

普濟方卷三百七十二